

## Frequência de Álgebra Linear

Ano letivo: 2017/2018 Sem.: 1º Época: Normal Data: 18/12/2017

Curso: Licenciatura em Economia

A integridade académica é um valor fundamental da FEUC. O Regulamento Pedagógico da UC proíbe e sanciona as várias formas de fraude académica. Durante a realização das provas escritas é exigido que: Não usem materiais de consulta, máquinas calculadoras gráficas ou quaisquer outros equipamentos eletrónicos, exceto se tal for explicitamente permitido pelo responsável da unidade curricular em causa; não transmitam as questões da prova a outras pessoas; mantenham desligados quaisquer equipamentos de comunicação; usem exclusivamente as folhas de exame fornecidas pelos vigilantes da prova.

Duração: 2h 00m

A comprovada fraude académica determina a anulação da prova, a impossibilidade de o/a Estudante concluir a unidade curricular com aproveitamento, a comunicação ao Diretor da FEUC e, eventualmente, a comunicação ao Reitor, para aplicação de sanções disciplinares.

1. Considere a matriz 
$$D = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 0 & -1 \\ 2 & 0 & -3 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ -2 & 2 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$
 e os vetores  $x = (x_1, x_2, x_3, x_4)$  e b =  $(0, 1, 3, -2)$ .

- a. Calcule o determinante de D, referindo o método/propriedades que utilizar.
- b. Calcule o elemento (2,3) da matriz dos cofatores de D e o elemento (4,2) da matriz adjunta de D.
- c. Sabendo que os elementos (1,2) e (2,2) da adjunta de D são, respetivamente, -4 e 2, apresente toda a segunda coluna da matriz inversa de D.
- d. Utilizando a regra de Cramer, calcule  $x_3$ , solução parcial do sistema Dx = b.

2. Considere a matriz 
$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$
 e o vetor  $v = (0, \alpha, 1), \alpha \in \mathbb{R}$ .

- a. Utilizando a definição de vetor próprio, determine o valor de α para o qual v é vetor próprio de A, e indique o valor próprio associado.
- b. Calcule os valores próprios da matriz A e as respetivas multiplicidades algébricas.
- c. Defina o espaço próprio associado ao valor próprio de menor valor absoluto.
- d. Diga, justificando, se a matriz A é diagonalizável e, em caso afirmativo, escreva as matrizes S e Λ, tal que A=SΛS<sup>-1</sup>.
- 3. Encontre a matriz  $B \in R^{2\times 2}$  tal que  $B = B^T$ , Bu = 2u com u = (-1,1) e Bv = 6v com v = (1,1).
- Sabendo que 1, 2 e 3 são os valores próprios da matriz C∈ R<sup>3×3</sup> calcule os valores próprios da matriz adjunta de C.

Comece a resolver os exercícios na segunda página de prova, deixando a primeira em branco.

Cotação: Todas as alíneas valem 2 valores.

Respostas sem justificação não serão consideradas.